



CONSULTORES EN GASTROENTEROLOGÍA

TRILYTE / BISCODYL / DULCOLAX PREPARACIÓN INSTRUCCIONES

Doctor: _____

Fecha de Colonoscopy: _____

Ubicación: West Columbia Northeast Otro: _____

Hora de Llegada: _____ AM PM

El día antes de su procedimiento:

NO COMA ALIMENTOS NI BEBA LECHE. BEBE SOLAMENTE LÍQUIDOS CLAROS. Cualquiera de los siguientes son aceptables. (Por favor, evite los líquidos rojos y púrpuras.)

Agua

Zumos de frutas colados sin pulpa (manzana, uva blanca o limonada)

Bebidas deportivas (como Gatorade)

Bebidas sin alcohol (gaseosas o no gaseosas)

Café o té (sin leche o crema no láctea).

Caldo claro o caldo

Paleta helada (azul, verde, amarillo, naranja o rosa)

Jell-O simple (sin frutas o ingredientes agregados)

Completa todos los pasos a continuación:

PASO 1: Tome una tableta de 10 mg de Bisacodyl a las 12:00 del mediodía (Dulcolax - en el mostrador)

Tome la tableta de bisacodilo con agua.

No triture ni mastique.

No tome la tableta de bisacodyl con una hora de tomar un antiácido.

PASO 2: Mezclar la solución y refrigerar.

Si está tomando Trilyte Lemon-Lime, abra el frasco O si está tomando Trilyte con paquetes de sabores, abra un paquete de sabor de elección y vierta en el frasco Trilyte. La solución se puede utilizar con o sin los paquetes de sabor proporcionados. Deseche los paquetes no utilizados.

Agregue agua potable a la línea superior de la botella Trilyte. Tapar la botella y agitar para disolver el polvo. La solución reconstituida será clara e incolora. Usar dentro de las 48 horas. No se deben agregar ingredientes adicionales a la solución (aparte del paquete de sabor).

Si su procedimiento es antes de las 10:00 a.m.

PASO 3: A las 5:00 p.m.

Beba un vaso de solución (8 onzas) cada 10 a 15 minutos hasta que desaparezca toda la solución. Bebe cada vaso rápidamente en lugar de tomar muchos sorbos. NO coma ni beba nada después de la medianoche, ni siquiera el agua.

Si su procedimiento es a las 10:00 a.m. o después:

PASO 4: A las 5:00 p.m.

Tomar la mitad de la preparación líquida. Tome la otra mitad de la preparación líquida de 4 a 6 horas antes de su procedimiento. No coma ni beba nada después de la medianoche, excepto la preparación.