

CLARO DIETA LÍQUIDA

Todo el día antes de su procedimiento, sólo puede tener líquidos claros. Líquidos claros son líquidos que pueden ver a través de temperatura de la habitación. (Esto no significa que usted debe beber a temperatura ambiente.) Si usted no puede ver a través de ella, no se puede tener.

Cualquiera de los líquidos a continuación están bien, y siempre que no sean rojas o de color púrpura . Las siguientes cosas:

- Agua Café o té sin leche o crema no láctea (azúcar puede ser utilizado)
- Dieta Regular o refrescos (Coca Cola, Pepsi, Ginger Ale, Sprite, 7-Up, Mountain Dew)
- Tensas zumo de fruta sin pulpa (manzana, uva blanca)
- Caldo o caldo claro
- Las bebidas deportivas (Gatorade o Powerade)
- Claro JELL-O (sin añadir frutas o los ingredientes)
- Limonada
- Las paletas heladas

Las siguientes cosas NO ESTÁN permitidos:

- Ningún alimento sólido
- Ningún producto lácteo
- NO nublado zumos de naranja o jugo de piña
- NADA DE rojo o púrpura líquidos
- NO HAY aceite de pescado 7 días antes del procedimiento

Para los pacientes con Diabetes: Tomar la mitad de su medicamento para controlar la diabetes el día antes de su procedimiento y NO HAY medicamento para controlar la diabetes el día de su procedimiento. Favor de traer el medicamento.

Para los pacientes que toman Coumadin o cualquier otro medicamentos anticoagulantes: Pregunte a su médico cómo puede ajustar los medicamentos.

Preguntas Frecuentes:

1. ¿Debo tomar los medicamentos el día de mi procedimiento?

Sí, usted puede tomar la presión sanguínea, el corazón, el asma, la incautación y medicamentos para la tiroides con un pequeño sorbo de agua.

2. Cuando es la hora de inicio de la dieta líquida?

Esta dieta se aplica a todo el día antes de su procedimiento, desde el momento en que se despierta hasta las doce de la noche antes del día de su procedimiento.

3. ¿Cuáles son los ejemplos de color rojo o púrpura líquidos?

Usted no puede tomar líquidos rojo o morado, como jugo de arándano o zumo de uva.

4. ¿Qué es lo último que puedo tomar para dormir o medicamentos para el dolor un día antes de mi procedimiento?

Usted debe tener no más tarde de las 8 de la noche antes del procedimiento.

5. ¿Cómo puedo ajustar mi diabetes insulina medicamento el día antes de mi procedimiento?

Si usted se encuentra en la insulina, toma la mitad de la dosis asignados el día antes del procedimiento. Si usted se encuentra en las pastillas anticonceptivas, tome la mitad la dosis de pastillas (ex: si Usted toma dos, más que un solo; si se toma una píldora, o bien pasar o que por la noche el día antes del procedimiento).

6. ¿Puedo tomar cualquiera de mis otros medicamentos en el día antes de mi procedimiento?

Sí, a otros medicamentos, como los antidepresivos, multivitaminas, alergia o píldoras para el control de la natalidad, deben tomarse el día antes del procedimiento.

7. Cualquier forma de alcohol se consume antes de mi procedimiento?

No se puede consumir alcohol el día antes o el mismo día del procedimiento.

8. ¿Será capaz de conducir hasta su casa después de mi procedimiento?

No, no será capaz de manejar después de su procedimiento. Una persona responsable tendrá que venir con usted, estancia en nuestra sala de espera durante El procedimiento y lo lleve a su casa.